

FOLIAR APPLICATION

F

葉面散布資材



Rooted in Science


輸第 101558 号

カーボン タイガー 4-4-16

- ◆ カーボン タイガーはフロラティン独自のカーボンパワー技術を応用した葉面吸収専用肥料です。
- ◆ NPK をバランスよく葉面から確実に補給し、芝草の成長を支え、ストレス耐性を強化します。
- ◆ カーボンパワー技術に使用されているクレニックサブリンは生物学的に現存する最も活性の高い有機複合物質ですので、栄養素の吸収と転流が格段に向上します。
- ◆ 即効性に優れ、流失・流亡のリスクが極端に低く、安全且つ高い経済性を誇ります。

カーボン タイガーの効果

- およそ 3 時間で 98% の吸収率
- 少量で高い肥料効果
- 葉細胞とストレス耐性の強化
- バランスのとれた芝の成長と発色
- 芝細胞の強化
- 植物体内における栄養素の肥料効果改善
- 即効性



- カーボンパワー技術を応用したフロラティン製品は、活性の高い有機酸の働きで栄養素の吸収効果、転流を飛躍的に改善します。
- 状況に合わせて他のフロラティン製品を混合することにより、更に効果的な施肥が可能です。詳しくはTAP(タップ・芝草活性プログラム)をご参照ください。

カーボン タイガー 4-4-16

成分表

窒素全量	4.00%
内 アンモニア態窒素	1.15%
尿素	2.85%
リン酸	4.00%
カリウム	16.00%
硫黄	4.00%
規格	10 ㍓ × 1 / 5 ㍓ × 1
比重	1.323kg / ㍓

カーボン タイガーに含まれる成分の役割

窒素	: 植物細胞の成長と葉緑素形成の要となる要素
リン酸	: ATP(エネルギー供給)、呼吸エネルギー源
カリウム	: 寒さ、暑さ、萎れの耐性強化の要で蒸散のためにも必要な要素
硫黄	: 窒素の安定化、窒素利用、タンパク質合成の酵素活性
クレニックスプリン	: 炭素に富む有機物で、栄養素の吸収と転流を促進し、根の成長、光合成、呼吸を促進

No Carbon No Life!!

プロ使用ガイドライン

カーボン タイガーは葉面吸収散布専用資材です。ほぼすべての養分は約 3 時間で葉面から吸収されますので、散布後 3 時間は散水を控えてください。注: 吸収時間は天候に影響されることがあります。

推奨施用量 : 0.50~1.00ml / m²

散布間隔 : 7~14 日 (注: 効果の持続期間は土壌環境や降雨などの影響によって異なります)

推奨散布水量: 30~50ml / m²

投入順序 : ⑦

使用上の注意:

- フロラティン社資材との混合手順は別紙「タンクミックスの手順」をご参照ください。
- 他資材との混合使用は、必ず事前に混和性、効果をテストで確認してから行ってください。
- 容器を十分に振ってからご使用ください。
- タンクミックスする際は良く攪拌し、散布時も攪拌を続けてください。
- 希釈した溶液はその日のうちに使い切ってください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 一度開封した製品を保管する際は密閉し、高温多湿を避け、できるだけ早く使い切ってください。
- 5℃以下での保管は避けてください。

Ver. 2016.01.18



Rooted in Science

フロラティン・ジャパン株式会社

〒104-0042 東京都中央区入船 2-10-7-4F

TEL: 03-3523-4882 FAX: 03-3523-4883

取扱代理店