

播種直後の発根促進

“播種直後の初期成育(発根)を促進し、早期活着を目指す”

インターシード、オーバーシードなど、管理の中で確実な播種とその後の育成は大変重要なポイントになります。水分や栄養素を吸収促進する吸収根を早期に充実させることで、限られた養生期間で種の生育・活着を促し、その後の激しい利用に対応できる健全な芝をつくります。

発根の違い (バミューダ芝播種後 20 日経過)



左：ジャーミネックスなし

右：ジャーミネックス 10g/種 1kg

発根の様子 拡大写真

■ ジャーミネックス

微粉末の植物活性材です。バランスの良い微量元素をベースに、発芽後の旺盛な発根を促進します。全体的な播種だけでなく、ディポット補修時の砂・種に混ぜ使用することも可能です。

施用量：5～10g / 種子 1kg 荷姿：1kg / 缶

使用方法：

種にまぶして使用します。バケツやペットボトルなどに種とジャーミネックスを入れ、よく混ぜてご使用ください。

発芽後、3葉以上に生長した後は、効果の早い極少量散布で更なる発根を促進させることが可能です

発根プログラム ※施用量は芝の生長に合わせて調整して下さい

- ・アストロン 0.25ml/m²
- ・P-48 0.25ml/m²
- ・グライコフェーズ 0.25ml/m²



Rooted in Science

フロラティン・ジャパン株式会社

〒104-0042 東京都中央区入船 2-10-7-4F

TEL: 03-3523-4882 FAX: 03-3523-4883

URL: www.floratinejapan.com

取扱代理店